





宮古保健所管内 感染症発生動向(第14週) 平成31年4月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.25人→2.50人→0.75人→0.50人→**1.75人**
 沖縄県 : 6.12人→5.81人→5.21人→4.78人→**3.52人**
 全国 : 4.12人→2.92人→2.49人→1.73人→**1.46人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核(中部1件、南部3件、那覇2件)
- 三類 : 細菌性赤痢(南部1件)
- 四類 : レジオネラ(北部1件)
レプトスピラ(北部1件)
- 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症(北部1件)
侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件)

* 風しん









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に10件の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

* 麻しん(はしか)

現在、麻しん患者が来県していたことが報告されています。麻しんは発熱、咳、鼻水、結膜充血、目やになどで、一旦熱が下がった後、高熱と発疹が出現します。肺炎や脳炎を合併すると死亡することもあります。これまで麻しんにかかっていない方、麻しんの予防接種を受けていない方は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第14週) 平成31年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第14週 4/1~4/7)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 2月 | | | 3月 | | 4月 |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 保健所等\週 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| インフル エンザ (報告数) | 北部 | 37 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 |
| | 中部 | 199 | 139 | 163 | 126 | 104 | 73 |
| | 那覇市 | 137 | 100 | 95 | 86 | 45 | 60 |
| | 南部 | 159 | 95 | 52 | 78 | 112 | 58 |
| | 宮古 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| | 八重山 | 18 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| | 沖縄県 | 564 | 355 | 337 | 302 | 277 | 204 |
| | 全国 | 29384 | 20454 | 14488 | 12320 | 8567 | 7227 |
| インフル エンザ (定点あたり 報告数) | 北部 | 7.40 | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 1.20 |
| | 中部 | 9.95 | 6.95 | 8.15 | 6.30 | 5.20 | 3.65 |
| | 那覇市 | 11.42 | 8.33 | 7.92 | 7.17 | 3.75 | 5.00 |
| | 南部 | 11.36 | 6.79 | 3.71 | 5.57 | 8.00 | 4.14 |
| | 宮古 | 3.50 | 2.25 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 1.75 |
| | 八重山 | 6.00 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 9.72 | 6.12 | 5.81 | 5.21 | 4.78 | 3.52 |
| | 全国 | 5.93 | 4.12 | 2.92 | 2.49 | 1.73 | 1.46 |

| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週 4/1～4/7）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 2/18～ 2/24 | 2/25～3/3 | 3/4～3/10 | 3/11～ 3/17 | 3/18～ 3/24 | 3/25～ 3/31 | 4/1～4/7 |
| 0-4歳 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5-9歳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20-29歳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30-39歳 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40-49歳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70-79歳 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80歳以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 26 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 |







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第15週） 平成31年4月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.50人→0.75人→0.50人→1.75人→**2.75人**
 沖縄県 : 5.81人→5.21人→4.78人→3.52人→**3.98人**
 全国 : 2.92人→2.49人→1.73人→1.46人→**1.67人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(北部)
 急性出血性結膜炎(那覇市)
 <注意報レベル> **水痘(宮古)**



*** 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核(北部1件、中部3件、那覇市1件)
- 四類 : レジオネラ(南部1件)
- 五類 : 急性脳炎(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、南部1件)
 後天性免疫不全症候群(北部1件)

*** 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に10件の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっている方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 麻しん(はしか)**

現在、麻しん患者が来県していたことが報告されています。麻しんは発熱、咳、鼻水、結膜充血、目やになどで、一旦熱が下がった後、高熱と発疹が出現します。肺炎や脳炎を合併すると死亡することもあります。これまで麻しんにかかっている方、麻しんの予防接種を受けていない方は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第15週) 平成31年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週 4/8～4/14）

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 2月 | 3月 | | | | 4月 | |
|-----------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 保健所等\週 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
| | 中部 | 139 | 163 | 126 | 104 | 73 | 95 | |
| | 那覇市 | 100 | 95 | 86 | 45 | 60 | 62 | |
| | 南部 | 95 | 52 | 78 | 112 | 58 | 57 | |
| | 宮古 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| | 八重山 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
| | 沖縄県 | 355 | 337 | 302 | 277 | 204 | 231 | |
| | 全国 | 20454 | 14488 | 12320 | 8567 | 7227 | 8282 | |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 0.60 | |
| | 中部 | 6.95 | 8.15 | 6.30 | 5.20 | 3.65 | 4.75 | |
| | 那覇市 | 8.33 | 7.92 | 7.17 | 3.75 | 5.00 | 5.17 | |
| | 南部 | 6.79 | 3.71 | 5.57 | 8.00 | 4.14 | 4.07 | |
| | 宮古 | 2.25 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 2.75 | |
| | 八重山 | 1.00 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | |
| | 沖縄県 | 6.12 | 5.81 | 5.21 | 4.78 | 3.52 | 3.98 | |
| | 全国 | 4.12 | 2.92 | 2.49 | 1.73 | 1.46 | 1.67 | |

警報
 (30人以上)

注意報
 (10人以上)

流行の兆し
 (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

小学校1クラス(4/18～4/21)

中学校1クラス(4/16～4/18)

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週 4/8～4/14）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

| 年齢\週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 2/25～3/3 | 3/4～3/10 | 3/11～3/17 | 3/18～3/24 | 3/25～3/31 | 4/1～4/7 | 4/8～4/14 |
| 0-4歳 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5-9歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10-14歳 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-29歳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30-39歳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40-49歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70-79歳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80歳以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 |





5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第16週） 平成31年4月




*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.75人→0.50人→1.75人→2.75人→**8.00人**
 沖縄県 : 5.21人→4.78人→3.52人→3.98人→**3.78人**
 全国 : 2.49人→1.73人→1.46人→1.67人→**2.54人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(北部)
 流行性角結膜炎(那覇市)
 <注意報レベル> なし

*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(那覇市1件、南部2件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
- 五類 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件、南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症
 (那覇市2件、北部1件、中部1件、南部1件)
 百日咳(中部1件)
 播種性クリプトコックス症(那覇市1件)
 梅毒(中部1件)
 麻疹(南部1件)




*** 風しん**

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に10件の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。









※大型連休を前に注意すべき感染症について、沖縄県地域保健課よりプレスリリースがでておりますので、よろしければご活用ください。

【沖縄県感染症情報センター】

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/home.html>




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第16週) 平成31年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週 4/15～4/21）

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 3月 | | | 4月 | | |
|-----------------------|-----|-------|-------|------|------|------|-------|
| 保健所等\週 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 |
| | 中部 | 163 | 126 | 104 | 73 | 95 | 66 |
| | 那覇市 | 95 | 86 | 45 | 60 | 62 | 53 |
| | 南部 | 52 | 78 | 112 | 58 | 57 | 61 |
| | 宮古 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 32 |
| | 八重山 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| | 沖縄県 | 337 | 302 | 277 | 204 | 231 | 219 |
| | 全国 | 14488 | 12320 | 8567 | 7227 | 8282 | 12613 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 0.60 | 1.20 |
| | 中部 | 8.15 | 6.30 | 5.20 | 3.65 | 4.75 | 3.30 |
| | 那覇市 | 7.92 | 7.17 | 3.75 | 5.00 | 5.17 | 4.42 |
| | 南部 | 3.71 | 5.57 | 8.00 | 4.14 | 4.07 | 4.36 |
| | 宮古 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 2.75 | 8.00 |
| | 八重山 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 |
| | 沖縄県 | 5.81 | 5.21 | 4.78 | 3.52 | 3.98 | 3.78 |
| | 全国 | 2.92 | 2.49 | 1.73 | 1.46 | 1.67 | 2.54 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

小学校1クラス(4/18～4/21)

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院


2人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週 4/15～4/21）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|
| | 3/4～3/10 | 3/11～ 3/17 | 3/18～ 3/24 | 3/25～ 3/31 | 4/1～4/7 | 4/8～4/14 | 4/15～ 4/21 |
| 0-4歳 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5-9歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10-14歳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 30-39歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 40-49歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50-59歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 合計 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 32 |







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第17週） 平成31年4月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.50人→1.75人→2.75人→8.00人→**4.00人**
 沖縄県 : 4.78人→3.52人→3.98人→3.78人→**4.48人**
 全国 : 1.73人→1.46人→1.67人→2.54人→**2.17人**

*** 定点報告疾患について**


- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 手足口病(北部、八重山)
 <注意報レベル> 水痘(八重山)

*** 全数報告疾患について**









- 二類 : 結核(那覇市5件、中部3件、南部3件、宮古4件)
- 五類 : 急性脳炎(那覇市1件、南部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件)

*** 風しん**

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2019年に12件(5/7時点)の報告があります。風しんは発熱、発疹、リンパ節のはれが主な3つの症状です。妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんが先天性風疹症候群という重い病気を発症することがあります。これまで風しんにかかっている方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第17週） 平成31年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第17週 4/22~4/28)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 3月 | | 4月 | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------|------|-------|-------|
| 保健所等\週 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| | 中部 | 126 | 104 | 73 | 95 | 66 | 77 |
| | 那覇市 | 86 | 45 | 60 | 62 | 53 | 80 |
| | 南部 | 78 | 112 | 58 | 57 | 61 | 79 |
| | 宮古 | 3 | 2 | 7 | 11 | 32 | 16 |
| | 八重山 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| | 沖縄県 | 302 | 277 | 204 | 231 | 219 | 260 |
| | 全国 | 12320 | 8567 | 7227 | 8282 | 12613 | 10601 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 |
| | 中部 | 6.30 | 5.20 | 3.65 | 4.75 | 3.30 | 4.05 |
| | 那覇市 | 7.17 | 3.75 | 5.00 | 5.17 | 4.42 | 6.67 |
| | 南部 | 5.57 | 8.00 | 4.14 | 4.07 | 4.36 | 5.64 |
| | 宮古 | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 2.75 | 8.00 | 4.00 |
| | 八重山 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.67 |
| | 沖縄県 | 5.21 | 4.78 | 3.52 | 3.98 | 3.78 | 4.48 |
| | 全国 | 2.49 | 1.73 | 1.46 | 1.67 | 2.54 | 2.17 |

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット




宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週 4/22～4/28）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

| 年齢\週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|
| | 3/11～ 3/17 | 3/18～ 3/24 | 3/25～ 3/31 | 4/1～4/7 | 4/8～4/14 | 4/15～ 4/21 | 4/22～ 4/28 |
| 0-4歳 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5-9歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 10-14歳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30-39歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 40-49歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 32 | 16 |



5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

