


みゃ～く便り

～宮古家畜保健衛生所～

令　和　8　年　１　0　月　発　行
沖　縄　県　農　林　水　産　部
宮　古　家　畜　保　健　衛　生　所
宮古島市平良字西里１９５１
ＴＥＬ（０９８０）７２－３３２１
ＦＡＸ（０９８０）７２－６６７３


韓国で口蹄疫が発生！

今一度、発生予防を徹底しましょう！

今年、１０月に韓国で牛口蹄疫の発生が確認されました。
日本にも口蹄疫が侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況　（2026年1月以降）

	発生日	場所		動物種	飼養頭数
1	‘26/1/30	仁川	江華郡	牛	246
2	‘26/2/20	京畿	高陽市	牛	130
3	‘26/2/28	京畿	高陽市	牛	168
4	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	豚	5,500
5	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	186
6	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	81
7	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	130
8	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	39
9	‘26/7/3	慶北	醴泉郡	牛	72
10	‘26/9/2	慶北	醴泉郡	牛	46
11	‘26/9/2	慶北	醴泉郡	牛	86
12	‘26/9/14	仁川	江華郡	牛	126
13	‘26/9/16	仁川	江華郡	牛	53
14	‘26/10/3※	慶北	醴泉郡	牛	98



出典：韓国農林畜産食品部、WOAH
注：日付はWOAH報告の発生日（※：WOAH未報告の場合は韓国当局公表日）
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数

2026年10月6日時点
農林水産省動物衛生課

豚・牛農家の皆様へ
発生予防の徹底をお願いします！

- □ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- □ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用**し、**手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- □ **畜舎専用の靴の着用**や**畜舎出入口に踏込消毒槽等を設置**することにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- □ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、**これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。**
- □ **毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



緊急注意報　わな猟・有害鳥獣捕獲に従事される皆様へ

10月に愛媛県と群馬県で豚熱が発生！
山からウイルスを持ち帰らない徹底対策

愛媛県 → 農場での感染確認
群馬県 → 大規模農場で発生

豚熱（CSF）とは


豚にとっては**極めて強い伝染病です。**



人に感染することはありません
豚やイノシシ特有の病気で人への影響はありませんが、発生した場合は全頭殺処分の危機になり地域の養豚業に壊滅的な打撃と出荷停止をもたらします。

ウイルスがいる場所

- 豚熱感染イノシシが確認された地域は特に注意が必要です。
- 感染したイノシシは糞便中などにウイルスを排出し、環境中(土壌、植物など) を汚染します。
- 環境中にウイルスがいる山に入ると、靴、車両のタイヤ、猟具等に付着して豚熱ウイルスを拡散させるおそれがあります。



感染を広げないために必要な行動

いつ、何をすればいいの？

- 捕獲作業実施後、大きく移動する際に**「洗浄」・「消毒」**を実施。
  （具体的には、別の山へ移動するとき、山を降りるとき、移動途中でコンビニなどに立ち寄るときなど。）
- 自家消費用の**解体時には、使い捨て手袋、衛生的な着衣**（レインコート、防護服等）を使用。※レインコートは使い捨て又は洗浄・消毒。
- 解体後の内臓等は、**放置せず二重に袋につつみ衛生的に処理する**か、やむを得ない場合は消毒等を適切に行い、公衆衛生の確保等に十分に配慮した上で適切に埋置する。
- 豚熱感染確認区域から、自家消費用を含む肉等を持ち出さない。
  ※「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」に従ってジビエ利用する場合は除く。
- 自宅に帰ってから特に念入りに**「洗浄」・「消毒」**を実施。次の猟場等にウイルスを持ち込まない。



洗浄・消毒の方法

- **靴の裏、タイヤ周り**
  →ブラシ・水などで土などの汚れを落とし、消毒する。
  （ウイルスは肉や血液だけではなく、糞尿、唾液等が混じっている土などにも含まれている可能性があります。靴裏やタイヤの溝の土などをブラシ等を使いながら逆性石けん液などで洗い流し、確実に洗浄・消毒します。）
- **器具（ナイフなど）**
  →ブラシ・水などで血液などの汚れを落とし、消毒する。
- **消毒方法**
  →アルコールスプレーや逆性石けん液等を噴霧器、じょうろ等でかけて行います。
  手指や衣服、猟具・ナイフなどで消毒薬のニオイや薬の残存が気になる場合はアルコールで。
  ※消毒薬は、薬局・ドラッグストア等で販売されています。



消毒のポイント（場所、ものなど）



繁殖成績改善の第一歩

暖地型牧草の品質向上ポイント

ウシの主食は「牧草」！適期に刈り取っていますか？

牧草の刈遅れにより栄養価や消化性が低下すること、さらに粗剛化によりウシの嗜好性が低下するだけでなく、選択採食による飼料の損失や飼料生産コストの増大を招くことがあります



おいしい旬の草が受胎率を高める！

ローズグラス（カリーデ / カタンボラ）

刈取り目安： 草高1m または 出穂始期（穂が1㎡あたり3本出た頃）

ギニアグラス（パイカジ / うーまく）

刈取り目安： 出穂始期 または 草高1～1.2m（固くなる前に収穫！）

ディジットグラス（トランスバーラ）

刈取り目安： 草高40～60cm（高品質で牛の食いつき抜群）

見た目の収量が増えても「固くて消化できない草」が増えるだけ！適期刈りが鉄則です。

コストと品質の落とし穴

知っておきたい「見かけの個数」の罠

沖縄県畜産経営技術指標を参考にし、2014年6月に実施したローズグラス「カタンボラ」の収量・品質調査結果を用いてロールベール乾草の生産個数と生産費を試算しました。

理想：適期刈り（出穂期）

消化できる草：たっぷり約半分
乾物消化率：47.3%
栄養価・ビタミンAも豊富！

実質コスト（消化できる分）
約２０，０００円/個




ロールの個数だけで
判断していませんか？

危険：9日後の刈遅れ

不消化ロールが1.8倍に激増
乾物消化率：41.8%に低下
草が固くなり食べ残し増加

実質コスト（消化できる分）
約２０，０００円/個（割高！）




「消化できないたくさんの牧草を収穫する」より、「**牛がしっかり利用できる牧草を収穫する**」を意識し、適期刈りを実践しましょう。

参考：知念雅昭，自給粗飼料の費用価を用いた刈取り適期の検討，普及指導員調査研究資料

対策のポイント

高病原性
鳥インフルエンザ



渡り鳥の飛来により、今シーズンも**高病原性鳥インフルエンザウイルスが我が国に侵入するリスクは極めて高い**状況です。
本病の発生を予防するため、**地域におけるリスク低減対策**を推進し、いま一度、**農場におけるウイルス侵入防止対策**を強化しましょう。

農場における発生予防対策

農場へのウイルス侵入防止対策の強化

飼養衛生管理の基本的な管理項目を毎月点検し、不備があれば改善。

人、物、車両の入出時対策

- 衛生管理区域専用の衣服や靴の使用。
- 着用前後で交差のない動線、明確な境界を確保。
- 適切な車両消毒、手指消毒の実施。
- 家きん舎ごとの専用の靴の使用。

野生動物の侵入防止、誘引防止

- 畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕。
  →特にネコ、イタチ、カラス等の侵入を防止
- ねずみ及び害虫の駆除
- 鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置。
- 餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止。

重点対策期間

渡り鳥の飛来が本格化する前の９月中には防疫体制を整備。
10月から翌年5月までは警戒を強化。
特に11月から翌年１月までは重点対策期間。

野鳥・野生動物対策

- 農場周辺のため池は、水抜きや忌避テープの設置等により野鳥の飛来を防止
- 農場周辺にカラス等の野鳥を誘引する施設や生息に適した環境がある場合は解消
- 野鳥等への安易な餌やり等の中止

健康観察と異状の早期発見

家きん所有者は毎日の健康観察を入念に行い、異状を認めた場合は速やかに管轄の家畜保健衛生所に届け出。

近年の発生地域ではリスクが高いことを認識し、特に重点的に対策を徹底。

家畜保健衛生所、産業動物獣医師など第三者の視点も活用して対策を向上させましょう。



宮古家畜保健衛生所
TEL　0980-72-3321

MAFF 農林水産省

飼養家きんの異状を見つけた場合は、最寄りの家畜保健衛生所に連絡。

農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→

令和７年度シーズンの疫学調査を踏まえて

MAFF 農林水産省

高病原性鳥インフルエンザ対策強化のポイント

昨シーズン発生事例の傾向

- 過去に発生した農場での再発事例が確認
- 大規模農場での発生が多数確認

過去シーズンの発生傾向を踏まえ以下の取組を実施

01 塵埃対策の実施

ウイルスに汚染された粉塵（じん）、羽毛等（塵埃（じんあい））によるウイルス伝播リスク低減のため飼養規模が20万羽を超える大規模所有者は以下のような取組を実施する。（令和８年10月１日施行）

フィルター・不織布の設置





細霧装置の設置



入気口の一部閉鎖



等

02 再発・密集地域等における発生リスク低減に向けた取組

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高い地域を予め大臣指定地域として指定し、地域内の農場は地域内での発生に備えた準備や野鳥誘引防止対策等の取組を実施する。

地域内での発生に備えた準備

- 地域内での発生に備えて家きん舎周辺を消毒するのに十分な量の消毒薬を各農場が備蓄
- 地域内で発生した際に各農場が塵埃対策を実施できるよう準備

地域一体となった対策の実施

- 農場周辺の野鳥生息状況等の把握
- 把握した情報に基づいた周辺環境におけるウイルス低減対策の検討および実施

農場内での野鳥誘引防止対策の実施例



池の周囲にネットを設置



水抜き



03 分割管理導入の検討

- 飼養規模が20万羽を超える大規模所有者は分割管理の導入に向けて具体的な検討を実施する。
- 分割管理を導入する場合には、家畜保健衛生所の確認を受け、指導に従う。

04 誘導換羽中も警戒を徹底

- 誘導換羽中は毎日の健康観察を注意深く行い、少しでも異常を感じた場合には、躊躇せずに家畜保健衛生所へ連絡を。
- 農場が制限区域内に入った場合には、制限区域が解除されるまでの間は、誘導換羽実施の見合わせ検討を。

R8年度 現場後代検定
沖縄県有種雄牛 紹介

大海之福（たいかいのふく）

糸桜系

生年月日：R3.6.9生　　審査得点:82.4点
生産者：㈲農業生産法人 大海（宮古島市）



ゲノム育種価（繁養・直検牛23頭中順位）		
枝肉重量	B	21位
ロース芯面積	B	23位
歩留基準値	B	22位
脂肪交雑	A	21位

茂北福（83.1）	北福波	北国7の8
	しょうの	平茂勝
たいかいみさ（84.5）	美津照重	美津照
	たいかいさわ	百合茂

「大海之福」は「茂北福」の後継牛で、本県から初めて全共第１区に出品されました。第１区出品の条件に合致する数少ない母牛で、宮古地域特有の血統が引き継がれた「たいかいみさ」を母牛に持ちます。ゲノミック評価ではなく、血統により選抜された地域独自性の強い種雄牛です。
体積のある気高系・糸桜系への交配を推奨します。

北百合茂（きたゆりしげ）

糸桜系

生年月日：R3.5.24生　　審査得点:83.4点
生産者：平仲 正彦（八重瀬町）



ゲノム育種価（繁養・直検牛23頭中順位）		
枝肉重量	B	19位
ロース芯面積	B	22位
歩留基準値	A	6位
脂肪交雑	A	16位

北百合平（84.7）	北福波	北国7の8
	ゆりかつ	百合茂
おきなわ61（81.4）	茂北福	北福波
	おきなわ38	美津照重

「北百合茂」は「北百合平」の初めての後継牛です。母のおきなわ61の一代祖は「茂北福」であり、血統を固めた種雄牛となっています。ゲノミック評価は皮下・歩留・脂肪交雑がA評価でその他はB評価となっていますが、戻し交配の効果がどのように出るか見たいところです。体積のある気高系・糸桜系への種付けを推奨します。

白鶴波（はくつるなみ）

糸桜系

生年月日：R3.3.20生　　審査得点:83.5点
生産者：石川 輔　　（今帰仁村）



ゲノム育種価（繁養・直検牛23頭中順位）		
枝肉重量	H	6位
ロース芯面積	H	2位
歩留基準値	H	1位
脂肪交雑	H	1位

福福波（83.5）	北福波	北国7の8
	やえみの１	福桜(宮崎)
はくつるまる（82.4）	白鵬85の3	勝忠平
	ゆりきくつる	百合茂

「白鶴波」は「福福波」の後継で、R6年度に選抜された「白鶴桜」の半兄弟になります。母「はくつるまる」は鳥取県からの導入牛で本県に来てからそのゲノミック評価の高さが判明しました。
「白鶴波」本牛も高いゲノム育種価評価となっており、皮下以外の評価がH、かつ当センターの種雄牛内での順位も非常に高くなっています。また共進会の種畜部門でも活躍を期待しています。

R8年度 現場後代検定
枝肉成績 速報値

R8.8.20
時点



糸桜系 たいかいのふく 大海之福

茂北福×美津照重×百合茂

	頭数	枝重	ロース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	11	484.8	65.3	8.2	2.3	75.2	9.30	100.0	81.8	56.9
雌平均	3	420.6	62.0	6.9	2.8	74.3	10.70	100.0	100.0	58.2
全平均	14頭	471.0	64.6	7.9	2.4	75.0	9.60	100.0%	85.7%	57.2

糸桜系 きたゆりしげ 北百合茂

北百合平×茂北福×美津照重

	頭数	枝重	ロース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	8	494.1	61.8	8.0	2.4	74.5	8.30	100.0	37.5	54.1
雌平均										
全平均	8頭	494.1	61.8	8.0	2.4	74.5	8.30	100.0%	37.5%	54.1

糸桜系 はくつるなみ 白鶴波

福福波×白鵬85の3×百合茂

	頭数	枝重	ロース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率	5等級率	MUFA
去勢平均	9	510.8	68.1	8.5	2.4	75.4	9.30	100.0	66.7	57.2
雌平均	3	524.3	81.3	8.9	3.1	76.6	9.70	100.0	75.0	57.5
全平均	12頭	514.2	71.4	8.6	2.6	75.7	9.40	100.0%	75.0%	57.3

沖縄県有種雄牛ゲノム育種価

※順位は現在繋養されている県有種雄牛中
（直接検定中の県有種雄牛は除外）

R8.5月解析

名号	父	母の父	母の祖父	枝肉重量		ロース芯		バラ厚		皮下脂肪厚		歩留		BMS		
					順位		順位		順位		順位		順位		順位	
美之姫	美百合	福之姫	白鵬85の3	H	1	H	1	H	4	B	13	H	3	H	1	R11年度選抜対象
白鶴波	福福波	白鵬85の3	百合茂	H	6	H	2	H	2	A	9	H	2	H	2	R8年度選抜対象
美百合	百合白清2	美国桜	勝忠平	H	4	H	3	H	3	B	12	H	5	H	3	供用
紗奈姫	福之姫	福之姫	幸紀雄	H	7	H	8	H	1	C	16	H	6	H	4	R11年度選抜対象
夏紀香	夏百合	幸紀雄	安福久	B	13	H	6	B	14	H	1	H	1	H	5	R10年度選抜対象
幸紀照重	幸紀雄	美津照重	安福久	D	19	A	15	C	16	B	10	A	13	H	6	供用
美津桜鵬	美津照重	美国桜	白鵬85の3	B	12	H	11	A	8	D	19	H	12	H	7	R9年度選抜対象
白鶴久	北美津久	白鵬85の3	百合茂	H	2	H	4	A	10	A	8	H	9	H	8	R11年度選抜対象
茂福輝	茂北福	百合白清2	福之国	B	11	B	16	A	6	D	18	B	17	H	9	供用
照百合守	美津照重	百合茂	勝忠平	C	18	B	17	D	19	B	14	B	16	H	10	供用
白鶴桜	美国桜	白鵬85の3	百合茂	H	5	H	5	A	9	H	3	H	4	H	11	供用
令鵬	百合白清2	白鵬85の3	美国桜	H	8	H	10	H	5	B	11	H	8	H	12	供用
美茂北	美百合	茂北福	安福久	H	9	A	14	B	12	C	17	B	18	H	13	R9年度選抜対象
宮之華	美津忠平	北福波	勝忠平	H	3	H	9	A	7	H	5	H	11	H	14	R10年度選抜対象
紗奈平	美津忠平	幸紀雄	美国桜	B	15	H	12	B	15	H	2	H	7	H	15	R10年度選抜対象
美津安清	美津忠平	美津照重	隆之国	B	16	A	13	C	18	H	4	A	14	A	16	R9年度選抜対象
北百合茂	北百合平	茂北福	美津照重	B	14	B	18	A	11	A	7	B	15	A	17	R8年度選抜対象
大海之福	茂北福	美津照重	百合茂	C	17	C	19	B	13	C	15	B	19	B	18	R8年度選抜対象
百合安清	百合白清2	安福久	平茂勝	A	10	H	7	C	17	A	6	H	10	B	19	供用

あなたの母牛の推定育種価を宮古家畜セリで配布します

繁殖雌牛（自己名義の繁殖雌牛に限る）の推定育種価を家畜セリ日に宮古・多良間家畜セリ市場にて配布します。受付に身分証明書をご提示ください」

