（様式2）

分野別施策・指標評価表（糖尿病対策）

C 個別施策

発症予防

番号	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖C−101）保険者による特定健診未受診者への受診勧奨の実施							
糖P−301	特定健診受診率	R3 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度		R11年
	市町村国保	32.8%	32.1%	32.8%	34.5%	↗	60%
	協会けんぽ	59.8%	57.7%	59.8%	64.2%	↗	70%
糖P−302	糖尿病治療中患者の特定健診受診率	R3年度	R2年度	R3年度	R4年度		R11年 50%以上
	市町村国保	21.0%	21.6%	21.0%	20.7%	↘	
（糖C−102）特定健診での有所見者への受診勧奨、保健指導の実施							
糖P−303	特定保健指導実施率	R3年度	R2年度	R3年度	R4年度		R11年 128医療機関以上
	市町村国保	62.3%	61.3%	62.3%	61.9%	↘	
	協会けんぽ	31.1%	27.0%	31.1%	24.5%	↘	
（糖C−103）事業主による従業員の健康・安全への配慮及び特定健診の受診環境の整備							
糖P−304	受診者の検査データの保険者への提供協力医療機関数	R4年度 89 医療機関	R3年度 76 医療機関	R4年度 89 医療機関	R5年度 87 医療機関	↘	R11年 128医療機関以上
	市町村国保	（75）	（74）	（75）	（75）	→	
	協会けんぽ	（14）	（2）	（14）	（12）	↘	
糖P−305	うちなー健康経営宣言登録事業者数	R4年度 1516 事業所	R3年度 816.0%	R4年度 1516 事業所	R5年度 1725 事業所	↗	R11年度 5000 事業所

重症化予防

番号	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖C−201）糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施							
糖P−306	糖尿病型 (HbA1c6.5以上、空腹時血糖126mg/dl) に対する 受診勧奨実施率	R3年度（4〜11月時	R2年度	R3年度	R4年度		R11年 100% （全ての対象者に受診勧奨を実施する）
		沖縄県 68.9%	沖縄県	沖縄県 68.9%	沖縄県 76.0%	↗	
		北部 52.7%	北部	北部 52.7%	北部 53.1%	↗	
		中部 75.3%	中部	中部 75.3%	中部 79.8%	↗	
		南部 68.5%	南部	南部 68.5%	南部 83.3%	↗	
		宮古 94.1%	宮古	宮古 94.1%	宮古 86.2%	↘	
		八重山 29.6%	八重山	八重山 29.6%	八重山 69.7%	↗	
糖P−307	糖尿病(HbA1c6.5以上、空腹時血糖126mg/dl)のうち、受診勧奨により受診した割合	R3年度	R2年度	R3年度	R4年度		R11年度
	市町村国保	65.7%	62.7%	65.7%	66.2%	↗	60%以上
	協会けんぽ	16.4%	34.5%	16.4%	22.1%	↗	60%以上
糖P−308	糖尿病性腎症患者への受診勧奨、保健指導の実施率	R3 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度		R11年度
	市町村国保	49.3%	43.1%	49.3%	56.3%	↗	100%
（糖C−202)糖尿病性腎症患者の透析予防のためのＰ							
糖P−309	尿中アルブミン・蛋白定量検査の実施割合	R3年度 27.16%	R2年度 データなし	R3年度 27.16%	R4年度 26.1%	↘	R11年度 40%
糖P−310	クレアチニン検査の実施割合	R3年度 87.70%	R2年度 データなし	R3年度 87.70%	R4年度 88.0%	↗	R11年度 88.3%
参考指標	透析予防指導管理料の実施件数 （SCR）	R2年度	R1年度	R2年度	R3年度		R11年度 現状より増加
		沖縄県 66	沖縄県 87	沖縄県 66	沖縄県 57	↘	
		北部 ※	北部 ※	北部 ※	北部 ※	―	
		中部 129	中部 158	中部 129	中部 65	↘	
		南部 40	南部 65	南部 40	南部 65	↗	
		宮古 ※	宮古 ※	宮古 ※	宮古 ※	―	
		八重山 ※	八重山 ※	八重山 ※	八重山 ※	―	

B 中間アウトカム

番号	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖B−101）糖糖尿病のリスクの減少及びリスクの高い人の早期発見							
糖O−201	血糖値の有所見率	R2年度	R1年度	R2年度	R3年度		R11年
	HbA1c6.5以上	8.4%	8.8%	8.4%	8.3%	↘	7.3%
	空腹時血糖 126mg/dl以上	6.9%	6.8%	6.9%	6.7%	↘	6.0%
糖O−202	メタボリックシンドローム該当率	R3年度	R2年度	R3年度	R4年度		R11年
	男性	30.3%	30.6%	30.3%	30.5%	↗	24.6%
	女性	10.0%	10.1%	10.0%	10.1%	↗	7.2%
糖O−203	メタボリックシンドローム該当率＋予備軍該当率	R3年度	R2年度	R3年度	R4年度		R11年
	男性	51.6%	51.8%	51.6%	51.2%	↘	42.6%
	女性	18.9%	19.1%	18.9%	18.8%	↘	13.0%

番号	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖B−201）糖尿病の重症化予防ができている							
糖O−204	特定健診で糖尿病性腎症第3期、第4期に相当する者の割合	R3 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度		R11年度 現状より減少
	市町村国保	14.8%	15.6%	14.8%	16.7%	↗	
	協会けんぽ	9.5%	9.3%	9.5%	10.2%	↗	

A 分野アウトカム

番号	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖A−101）糖尿病の重症化予防ができている							
糖O−101	新規透析患者数のうち原疾患が糖尿病性腎症の患者数（人口10万人あたり）R２国勢調査	R3年度 13.5人	R2年度 11.1人	R3年年度 13.5人	R4年度 11.9人	↘	R11年度 12.1人 （全国平均）
糖O−102	新規人工透析導入患者数 （SCR）	R2年度	R1年度	R2年度	R3年度		R11年 全国平均平均値 （100）
		沖縄県 128	沖縄県 118	沖縄県 128	沖縄県 131	↗	
		北部 170	北部 109	北部 170	北部 147	↘	
		中部 128	中部 107	中部 128	中部 122	↘	
		南部 118	南部 126	南部 118	南部 134	↗	
		宮古 ※	宮古 ※	宮古 ※	宮古 108	↗	
		八重山 ※	八重山 ※	八重山 ※	八重山 ※	―	
糖O−103	糖尿病患者の新規下肢切断術の件数（人口10万人あたり）	R3年度 沖縄県 99.6件		R3年年度 沖縄県 99.6件	R4年度 沖縄県 61.5件	↘	全国平均並みへの改善（現状より低下）

専門治療の体制整備

	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖C–301）１型糖尿病への専門的治療を行う医療提供体制の整備							
糖S–301	二次医療圏ごとの1型糖尿病治療対策医療機関数	R5年4月	R3年12月	R5年4月	R6年3月		R11年度
		沖縄県 21	沖縄県 20	沖縄県 21	沖縄県 22	↗	全ての医療圏での提供が可能な体制を確保
		北部 2	北部 2	北部 2	北部 2	→	
		中部 8	中部 7	中部 8	中部 9	↗	
		南部 11	南部 11	南部 11	南部 11	→	
		宮古 0	宮古 0	宮古 0	宮古 0	→	
		八重山 0	八重山 0	八重山 0	八重山 0	→	
（糖C–302）糖尿病の医療提供体制の確保							
糖S–302	専門医、登録医及び療養指導医の数	R5.11	R4.9	R5.11	R6.8		
	糖尿病専門医数 ※日本臏尿病学会認定	北部 1	北部 1	北部 1	北部 1	→	現状より増加
		中部 14	中部 14	中部 13	中部 15	↗	
		南部 45	南部 45	南部 46	南部 45	↘	
		宮古 0	宮古 1	宮古 1	宮古 2	↗	
		八重山 1	八重山 1	八重山 1	八重山 1	→	
	糖尿病専門医数（人口10万人あたり（R2年国勢調査））※日本糖尿病学会認定	全国 5.4	全国 5.1	全国 5.4	全国 5.5		
		沖縄 4.2	沖縄 4.1	沖縄 4.2	沖縄 4.5	↗	5.4
		北部 1.0	北部 1.0	北部 1.0	北部 1.0	→	5.4
		中部 2.5	中部 2.3	中部 2.5	中部 3.0	↗	5.4
		南部 6.2	南部 6.2	南部 6.2	南部 6.2	→	現状より増加
		宮古 1.9	宮古 0.0	宮古 1.9	宮古 3.8	↗	5.4
		八重山 1.9	八重山 1.9	八重山 1.9	八重山 1.9	→	5.4
	腎臓専門医数 ※日本腎臓学会認定	R5.11	R4.9	R5.11	R6.8		
		北部 3	北部 3	北部 3	北部 3	→	現状より増加
		中部 20	中部 21	中部 20	中部 22	↗	
		南部 58	南部 55	南部 58	南部 61	↗	
		宮古 1	宮古 1	宮古 1	宮古 1	→	
		八重山 3	八重山 2	八重山 3	八重山 1	↘	
	糖尿病専門医数（人口10万人あたり（R2年国勢調査））※日本糖尿病学会認定	全国 4.9	全国 4.7	全国 4.9	全国 5.0		
		沖縄 5.8	沖縄 5.6	沖縄 5.8	沖縄 6.1	↗	現状より増加
		北部 3.0	北部 3.0	北部 3.0	北部 3.0	→	4.9
		中部 3.9	中部 4.1	中部 3.9	中部 4.4	↗	4.9
		南部 7.8	南部 7.4	南部 7.8	南部 8.4	↗	現状より増加
		宮古 1.9	宮古 1.9	宮古 1.9	宮古 1.9	→	4.9
		八重山 5.6	八重山 3.8	八重山 5.6	八重山 1.9	↘	現状より増加
	糖尿病認定医師数 ※日本糖尿病協会認定	R5	R4	R5	R6.8		
		北部 3	北部 3	北部 3	北部 2	↘	現状より増加
		中部 20	中部 18	中部 20	中部 21	↗	
		南部 40	南部 41	南部 40	南部 39	↘	
		宮古 0	宮古 0	宮古 0	宮古 1	↗	
		八重山 1	八重山 1	八重山 1	八重山 1	→	
	糖尿病認定医数（人口10万人あたり（R2年国勢調査））※日本糖尿病協会認定	全国 2.9	全国 2.9	全国 2.9	全国 3.0		
		沖縄 4.4	沖縄 4.2	沖縄 4.4	沖縄 4.5	↗	現状より増加
		北部 3.0	北部 2.0	北部 3.0	北部 2.0	↘	2.9
		中部 3.9	中部 3.5	中部 3.9	中部 4.2	↗	2.9
		南部 5.4	南部 5.4	南部 5.4	南部 5.4	→	現状より増加
		宮古 0.0	宮古 0.0	宮古 0.0	宮古 1.9	↗	2.9
		八重山 1.9	八重山 1.9	八重山 1.9	八重山 1.9	→	現状より増加
	登録医数 ※日本糖尿病協会登録	R4	R3	R4	R5		
		北部 2	北部 3	北部 2	北部 2	→	現状より増加
		中部 12	中部 13	中部 11	中部 11	→	
		南部 12	南部 13	南部 13	南部 13	→	
		宮古 0	宮古 0	宮古 0	宮古 0	→	
		八重山 2	八重山 2	八重山 1	八重山 1	→	
	糖尿病認定医数（人口10万人あたり（R2年国勢調査））※日本糖尿病協会認定	全国 1.0	全国 1.0	全国 1.0	全国 1.0		
		沖縄 1.9	沖縄 2.1	沖縄 1.9	沖縄 1.9	→	現状より増加
		北部 2.0	北部 3.0	北部 2.0	北部 2.0	→	2.9
		中部 2.3	中部 2.5	中部 2.3	中部 2.2	→	2.9
		南部 1.6	南部 1.8	南部 1.6	南部 1.8	→	現状より増加
		宮古 0.0	宮古 0.0	宮古 0.0	宮古 0	→	2.9
		八重山 3.8	八重山 3.8	八重山 3.8	八重山 1.9	→	現状より増加
（糖C–303）質の高い初期・安定期治療の提供体制の整備							
糖P–311	医師会が実施する研修会への参加医療機関数	R4年度	R3年度	R4年度	R5年度		R11年度
		北部 41	北部 0	北部 41	北部 5	↘	現状より増加
		中部 64	中部 44	中部 64	中部 104	↗	
		南部 25	南部 60	南部 25	南部 90	↗	
		宮古 0	宮古 5	宮古 0	宮古 0	→	
		八重山 0	八重山 0	八重山 0	八重山 0	→	
（糖C–304）専門コメディカルの確保							
糖S–303	人口当たりの専門コメディカルの従事者数（人口10万人あたり）	R4年	R3年	R4年	R5年		R11年
	糖尿病療養指導士数（医療施設従事者数）（人口10万人あたり（H27年国勢調査））	全国 14.6	全国 14.6	全国 14.6	全国 14.2		
		沖縄県 16.1	沖縄県 17.4	沖縄県 16.1	沖縄県 15.7	↘	現状より増加
		北部 3.9	北部 4.9	北部 3.9	北部 4.9	↗	14.6
		中部 18.4	中部 18.6	中部 18.4	中部 17.6	↘	現状より増加
		南部 17.1	南部 19.2	南部 17.1	南部 16.4	↘	現状より増加
		宮古 13.4	宮古 13.4	宮古 13.4	宮古 17.2	↗	14.6
		八重山 7.5	八重山 7.5	八重山 7.5	八重山 7.5	→	14.6
	沖縄CDEL数（人口10万人あたり（H27年国勢調査））	沖縄 43.5	沖縄 41.8	沖縄 43.5	沖縄 42.3	↘	現状より増加
		北部 52.3	北部 51.3	北部 52.3	北部 48.3	↘	現状より増加
		中部 42.3	中部 41.3	中部 42.3	中部 40.3	↘	43.5
		南部 45.5	南部 43.2	南部 45.5	南部 45.1	↘	43.5
		宮古 5.7	宮古 5.7	宮古 5.7	宮古 5.7	→	43.5
		八重山 22.5	八重山 22.5	八重山 22.5	八重山 16.9	↘	43.5
（糖C–305）切れ目なく必要な治療が継続して提供されるための連携体制の構築							
糖P–312	沖縄津梁ネットワークを利用している糖尿病患者数	R4年度 4588 件	R3年度 4113 件	R4年度 4588 件	R5年度 5102 件	↗	新規患者の全例登録
糖P–313	糖尿病連携手帳の利用率 市町村国保 ※連携手帳利用者数÷治療中患者数	R4年度（4～11月末の数）	R3年度（4～12月末の数）	R4年度（4～11月末の数）	R5年度		R11年度
		沖縄県 8.8%	沖縄県	沖縄県 8.8%	沖縄県 5.9	↘	50%以上
		北部 7.1%	北部	北部 7.1%	北部 7.9	↗	
		中部 10.1%	中部	中部 10.1%	中部 8.5	↘	
		南部 7.4%	南部	南部 7.4%	南部 3.8	↘	
		宮古 13.7%	宮古	宮古 13.7%	宮古 9.9	↘	
		八重山 1.9%	八重山	八重山 1.9%	八重山 1.1	↘	

	指標項目	基準年	直近の前々年	直近の前年	直近	結果	目標
（糖B–201）治療が必要な患者の適切な受診							
糖O–205	血糖有所見者の未受診者・治療中断者の割合 ※有所見：HbA1c6.5、空腹時血糖126mg/dl ※治療中断者：1年受診がない者	R3 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度		
	市町村国保	47.4%	35.2%	47.4%	48.8%	↗	33.1%以下
	協会けんぽ（未受診者のみ）	22.8%	24.4%	22.8%	18.2%	↘	15.96%以下