

## 2010年におけるシャコガイ類の 採卵および種苗生産結果と配布 (シャコガイ種苗生産事業)

井上 順\*・岸本和雄

### Spawning, Result of Mass Seed production and Distribution in Giant Clams in 2010

Ken INOUE<sup>\*1</sup> and Kazuo KISHIMOTO

漁業者より要望されたシャコガイの種苗数を満たすため、種苗生産を行った。産卵誘発は、ヒレナシジャコで4回、ヒレジャコで2回を行い、それぞれ8,310万粒、12,133万粒を採卵した。種苗生産の結果、それぞれ収容幼生数・共生成立時の生残率・殻長1.0mmまでの生残率は、ヒレナシジャコ 6,179万個体・8.4%・0.4%，ヒレジャコ 7,412万個体・13.5%・24%だった。例年と比較して、共生成立率は高かったが、その後の生残率が低い結果となった。配付数は、平成21年度生産種苗ではヒレナシジャコ1,600個体、ヒレジャコ7,900個体であり、平成22年度生産種苗ではヒレジャコ125,600個体であった。平成22年度生産種苗のヒレジャコ約30,000個体は次年度で配付することとした。

#### 目的

この事業は、養殖用又は放流用のシャコガイ類の種苗を量産して漁業者等に安定した種苗配布を行い、計画的な漁業生産に資することを目的とする。ただし、ヒメジャコの生産は、平成21年より沖縄県栽培漁業センターで行われることとなった。そのため、ヒメジャコの報告は、配布のみとした。

#### 材料及び方法

##### (1) 平成21年度生産群の中間育成・配布

岩井ほか (2006) に準じた。

##### (2) 採卵

ヒレナシジャコの親貝は、1990年に生産した貝（以下、90年貝とする），1998年に生産した貝（以下、98年貝とする），2002年に生産した貝（以下02年貝とする）およびパラオより輸入した貝（以下、パラオ貝とする）を用いた。ヒレジャコの親貝は天然貝を用い、その産地は八重山海域（以下、八重山貝とする）と沖縄本島国頭海域（以下、国頭貝とする）の2種類とした。両種とも川平湾内で養成した。

親貝は採卵を行う1ヵ月前から、光の弱い条件（ $500\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ 以下）となるように水槽上面を遮光

した水槽内で飼育した。採卵日は光の強い晴天日を選んだ。

親貝は、午前9時から殻を洗浄し、その後90分間干出した後、砂濾過海水を満たした円形500Lポリカーボネイト製の誘発水槽に静置し、止水状態で30分毎に数秒通気した。誘発水槽は3～4基準備し、それぞれの水槽は、生産年度毎、採集地毎にグループわけをして親貝を収容した。すなわち、ヒレナシジャコは90貝、98年貝、02年貝およびパラオ貝に、ヒレジャコは八重山貝と国頭貝に分けた。静置2時間後、放精を始める個体が出現しない場合は、誘発水槽に冷凍の精子懸濁液を投与した。それ以降、1～2時間毎に誘発水槽内の海水を換え、精子懸濁液を投与した。数回換水を行い、それでも放卵にいたらしくは誘発水槽に冷凍の卵懸濁液を投与した。夕方になっても放卵がない場合、誘発水槽を止水飼育から流水飼育へ切り替え、30分毎に観察を継続した。23時まで放卵がない場合、採卵作業を終了した。

生きよく放精を始めた個体が複数となった場合、その誘発水槽から30L程度海水を採取し、日陰で微通気しながらくみ置きした（以下、媒精液とする）。その際、他の誘発水槽から生きた精子が混入しないよう細心の注意を払った。それぞれの媒精液は、放精状況が

\*Email:inoueken@pref.okinawa.lg.jp

よく、それらの個体数が増えた場合に差し替えを行った。放卵を始めた個体は、誘発水槽から取り上げ、 $10\mu\text{m}$ フィルターを透過した海水（以下フィルター海水）で数回洗ったのち、誘発水槽と同型の採卵水槽に移した。媒精は、自家受精率を低くするため、親貝を採卵水槽に移すと同時に、くみ置きした媒精液から $200\sim 1000\text{mL}$ 添加して行った（Kuriharaほか、2010）。その際の媒精液は、放卵個体が収容されていた誘発水槽とは別の水槽から採取した媒精液を用いた。採卵水槽には、フィルター海水を使用し、強通気した。このとき、採卵水槽の海水を2点（5mL）採取し、実体顕微鏡下で正常卵を計測した。この数値を元に、「（平均計測数／5mL）×100,000」を採卵数とした。

得られた卵は、極体あるいは卵割の確認後、採卵水槽内の密度が $6\sim 10$ 粒/mLとなるように $35\mu\text{m}$ メッシュで分槽し、中通気で翌日のふ化を待った。翌日、採卵数計測と同様な方法で、ふ化幼生数を計測し、ふ化率（ふ化幼生数／採卵数）を求め、収容ふ化幼生の選定時の参考にした。

### （3）種苗生産・中間育成

ふ化幼生は、幼生飼育水槽（屋内4kL、5kL、10kL又は16kLFPR水槽）に $0.3\sim 0.7$ 個体/mLの密度で収容した。種苗生産期間中の海水は、全てフィルター海水を使用した。飼育方法は止水方式で行い、通気は着底期前まで強程度、それ以降は中程度にした。

褐虫藻は、使用当日シャコガイの外套膜を切り取り、 $0.8\text{L}$ のフィルター海水とともにミキサーで攪拌して得た液を、約 $170\mu\text{m}$ メッシュで濾したものを使用した。基準となる褐虫藻の投与方法は、日齢 $2\sim 3$ で $30\text{cell/mL}$ 、日齢 $5\sim 7$ で $10\text{cell/mL}$ 、日齢 $9\sim 11$ で $5\text{cell/mL}$ とした。日齢 $15$ 以降でも共生成立個体が現れないときは3日毎に $5\text{cell/mL}$ の褐虫藻を投与し続けた。

水槽の換水は、底面が干出しない程度まで海水を抜き取る作業（以下、半換水）、水槽内の海水を稚貝ごとすべて抜き取る作業（以下、全換水）の2つを使い分けた。半換水は1週間毎に、全換水は3週間毎を基準に行ったが、赤色細菌や死貝の増加が観察されたときにはすぐに全換水を行った。全換水毎に生残個体数を容積法で推定した。その方法は、プランクトンネットに回収された幼生を、 $20\text{L}$ の水量が入っている $30\text{L}$ パンライトに収容し、常に同職員1名が両手で攪拌しながら海水をサンプリングした。サンプリングは、2点（5mL）とし、実体顕微鏡下で内蔵や鞭毛の活動が確認できた幼生だけを計測した。この数値を元に、生残個体数を「（平均計測数／5）× $20\times 1000$ 」とした。共生成立の到達日令は、生残個体数推定時のサンプリングで、共生成立率（共生成立個体数／観察個体数）が $70$

%を越えたときとした。光の調整は、水面下 $300\sim 800\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ を維持するように遮光幕を調整した。それらの作業は平均殻長 $1\text{mm}$ になるまで続けた。

便宜上、殻長 $1\text{mm}$ 稚貝までの期間を種苗生産、それ以降を中間育成とした。平均殻長 $1\text{mm}$ に成長した後は、飼育水槽内の水位を $30\sim 50\text{cm}$ に下げて、10回転/日以上の流水飼育を行った。必要に応じて小型藻食性巻貝（ウミニナ類：*Batillaria spp.*、カニモリガイ類：*Clypeomorus spp.*あるいはアマオブネガイ：*Nerita albilla*）を投与して藻類の繁茂防止に努めた。水槽内の掃除と稚貝の密度調整を行うため、全換水を $3\sim 4$ 週間毎に行った。光の調整は晴天のとき屋外では $50\%$ 遮光幕を、屋内では $30\%$ 遮光幕を使用した。雨天では遮光幕を外した。殻長 $1\text{mm}$ 稚貝の生残個体数推定は原則種苗生産時の方法と同じように行つた。

殻長 $3\text{mm}$ 程度から稚貝と巻貝のサイズが近似し換水作業が繁雑になるため、巻貝の代わりに小型のタカセガイ *Tectus maximus* やニシキウズガイ *Trochus maculatus maculatus* を投与した。生残個体数の推定は重量法で行った。この時期から、光の調整は行わなかった。

種苗生産・中間育成の期間、定時に水温と光強度を測定した。水温は8時半に1回代表となる水槽を8箇所測定し、光強度は、8時間半と13時の2回、代表となる屋外1箇所と屋内2箇所を測定した。

## 結果及び考察

### （1）平成21年度生産群の中間育成・配布

前年度に採卵した稚貝を引き続き中間育成し、ヒレナシジャコ $1,600$ 個体、ヒレジャコ $7,900$ 個体を県内の漁協等に配布した（付表1）。

### （2）採卵

ヒレナシジャコの産卵誘発は4回行い、4回採卵した（表1）。そのうち3月4日と4月12日の産卵個体は、地下浸透海水で飼育した個体であった。

ヒレジャコの産卵誘発は2回行い、2回採卵した（表1）。ただし、5月25日に産卵した個体はその卵量が多く、採卵槽に粘液が多かった。そのため、採卵ネットやゴミとり用ネットに多数の卵が付着し、正確なふ化率が計測できなかった。

### （3）種苗生産・中間育成

種苗生産の結果を表2に示した。共生成立率の平均はヒレナシジャコ $8.4\%$ 、ヒレジャコ $13.5\%$ であった。稚貝が共生成立後から殻長 $1\text{mm}$ に成長するまでの生残率は、ヒレナシジャコ $0.4\%$ 、ヒレジャコ $24\%$ だった。共生成立後から殻長 $1\text{mm}$ までの飼育方法は、昨年度同様、止水飼育を行つた。両種の水槽では珪藻の繁茂がなかったが、5月25

日付けの採卵群で高い生残率を記録した。近年出荷種苗のほとんどは、梅雨明け後の強く安定した光量で屋外止水飼育を行った場合であった（井上・岸本，2009, 2010）。今後安定的に出荷できる飼育必要条件を、平成23年度から行われる「稚貝飼育技術開発」で検証していく必要がある。

平成22年度に採卵し中間育成を経て年度内に出荷した稚貝数はヒレジャコ125,600個体であった（付表1）。平成23年3月31日現在、ヒレジャコ約30,000個を飼育し、これらは次年度出荷とした。

### 今後の課題

- ・共生成立後の生残率向上

### 文 献

井上顕、岸本和雄、2009：シャコガイ類の採卵およ

表1 シャコガイ類の採卵結果

種	採卵回次	月	採卵日	採卵数 (万粒)	ふ化率 (%)	母貝の履歴	媒精個体の履歴
ヒレナシジヤコ	1	3/4	236	55%	98年貝	02年貝	
			563	100%	98年貝	02年貝	
			603	60%	98年貝	02年貝	
			335	92%	98年貝	02年貝	
			150	60%	02年貝	98年貝	
ヒレジャコ	2	4/12	840	73%	98年貝	02年貝	
	3	4/20	3,108	98%	△ 98年貝	02年貝	
	4	5/12	2,475	45%	90年貝	02年貝	
	計		8,310				
ヒレジャコ	1	3/20	1,733	84%	すべて 八重山の 天然個体		
ヒレジャコ	2	5/25	10,400	-	天然個体		
ヒレジャコ	計		12,133				

表2 平成21年度シャコガイ類の種苗生産結果

種	飼育回次	共生成立個体				殻長1mm個体				備考
		収容 (万粒)	幼生数 (万粒)	生残数 (万粒)	成立率 (%)	到達 自合	生残数 (万粒)	生残率 (%)	到達 日合	
ヒレナシジヤコ	1	1,470	49.6	3.4	19	0.3	0.02	74	0.50	地下海水実験個体が採卵
ヒレナシジヤコ	2	540	32.0	5.9	18	0.0	-	-	-	地下海水実験個体が採卵
ヒレナシジヤコ	3	3,047	350.4	11.5	16~20	1.4	0.04	63	0.4	
ヒレナシジヤコ	4	1,122	85.8	7.6	19~20	0.4	0.03	56	0.4	共生成立後毎日半換水
ヒレナシジヤコ	計	6,179	518	8.4		2	0.03	0.4		

ヒレジャコ	1	1,463	245.0	16.7	14~17	4.4	0.30	79~89	2	共生成立後不調
ヒレジャコ	2	5,949	615.2	10.3	13~23	284.3	4.78	41~57	46.2	共生成立後毎日半換水
ヒレジャコ	計	7,412	860.2	13.5		289	2.5	24.0		

び種苗生産結果と配布（シャコガイ種苗生産事業）.平成20年度沖縄県水産海洋研究センター事業報告書 70, 165-168.

井上顕、岸本和雄、2010：2009年におけるシャコガイ類の採卵および種苗生産結果と配布（シャコガイ種苗生産事業）.平成21年度沖縄県水産海洋研究センター事業報告書 71, 94-96.

岩井憲司、久保弘文、呉屋秀夫、竹内仙二、高橋尚子、2006：シャコガイ生産事業.平成14年度沖縄県水産試験場事業報告書 63, 185-195.

Kurihara T., Fuseya R., Katoh M. and Inoue K., 2010: Possibility of self-fertilization during hatchery culturing of giant clam, *Tridacna crocea*. Plankton Benthos Res. 5, 11-16.

付表1 平成22年度シャコガイ類の配付実績

種	出荷日	組織名 漁協	個数	設長平均	用途	出荷		要望 年度	生産 年度
						最小	最大		
ヒレジャコ	2010/11/10	八重山	600	35.34	養殖	20.5	64.1	22	21
ヒレジャコ	2010/11/18	八重山	1,000	19.66	養殖	1,114	10.2	30.4	22
ヒレジャコ	小計		1,600						
ヒレジャコ	総計		1,600						
ヒレジャコ	2010/11/1	伊江	2,000	11.58	養殖	427	7.6	17.0	22
ヒレジャコ	2010/11/1	伊江	5,000	11.58	養殖	854	7.6	17.0	22
ヒレジャコ	2010/11/2	八重山	4,500	15.22	養殖	1,511	11.3	21.1	22
ヒレジャコ	2010/11/2	八重山	500	38.76	養殖	30.6	54.3	22	21
ヒレジャコ	2010/11/4	八重山	4,500	14.68	養殖	1,503	12.4	18.7	22
ヒレジャコ	2010/11/4	八重山	500	38.76	養殖	3,796	30.6	54.3	22
ヒレジャコ	2010/11/9	八重山	4,500	14.48	養殖	2,004	9.1	19.7	22
ヒレジャコ	2010/11/9	八重山	500	42.61	養殖	3,796	29.6	60.2	22
ヒレジャコ	2010/11/9	八重山	4,500	14.48	養殖	2,004	9.1	19.7	22
ヒレジャコ	2010/11/9	八重山	500	42.61	養殖	3,796	29.6	60.2	22
ヒレジャコ	2010/11/10	八重山	29,000	13.34	養殖	6,271	9.2	20.5	22
ヒレジャコ	2010/11/10	八重山	1,000	42.61	養殖	3,796	29.6	60.2	22
ヒレジャコ	2010/11/12	八重山	4,500	11.39	養殖	826	8.4	14.4	22
ヒレジャコ	2010/11/12	八重山	500	42.61	養殖	3,796	29.6	60.2	22
ヒレジャコ	2010/11/15	糸満	1,000	21.31	養殖	1,491	12.8	38.8	22
ヒレジャコ	2010/11/15	糸満	1,000	21.31	養殖	1,491	12.8	38.8	22
ヒレジャコ	2010/11/16	八重山	19,000	12.61	養殖	4,229	8.6	17.5	22
ヒレジャコ	2010/11/16	八重山	1,000	33.48	養殖	3,600	20.4	55.9	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	1,000	11.82	養殖	168	8.6	14.5	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	4,500	10.57	養殖	689	7.1	12.9	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	500	42.61	養殖	3,796	29.6	60.2	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	19,100	10.98	養殖	2,872	8.7	17.0	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	900	30.51	養殖	2,807	20.1	47.8	22
ヒレジャコ	2010/11/24	八重山	20,000	10.42	養殖	3,351	9.1	13.7	22
ヒレジャコ	2010/12/3	宮古島	3,000	12.25	養殖	587	10.1	14.4	22
ヒレジャコ	2010/12/15	糸満	500	12.23	養殖	9.3	16.6	22	22
ヒレジャコ	小計		133,250			59,459			
ヒレジャコ	試験		0						
ヒレジャコ	総計		133,500			59,459			
ヒレジャコ	2010/4/28	八重山	300	23.9	放流	411	23.4	24.5	22
ヒレジャコ	2010/5/14	八重山	700	21.05	放流	1,237	14.7	25.0	22
ヒレジャコ	2010/5/28	石垣支所	66	22.2	放流	18.1	26.5	22	20
ヒレジャコ	2010/7/19	八重山	100	24.33	放流	19.0	29.6	22	20
ヒレジャコ	小計		0			0			
ヒレジャコ	試験		0			0			
ヒレジャコ	放流		1,166			1,648			
ヒレジャコ	総計		1,166			1,648			