


# レプトスピラ症の発生動向【沖縄県：2019年】

沖縄県感染症情報センター（沖縄県衛生環境研究所）

## 1 月別届出受理保健所別報告数


- ・例年、夏から秋にかけて報告が多くなります。
- ・2019年は、13人の報告がありました。
- ・届出受理保健所別報告数は北部が1人、中部が2人、那覇市が2人、南部が1人、八重山が7人でした。




## 2 性別年齢別

- ・男性が8割以上を占めています。
- ・年齢別では、20代が4人で最も多く、30代が3人、50代が2人、9歳以下及び40代、60代、70代以上が各1人でした。

2019年 男女別報告数 (n=13)





2019年 性別年齢別報告数 (n=13)




### 3 推定感染地域・経路

- ・推定感染地域は、八重山が8人で最も多く、次いで北部が3人、南部及び沖縄県内(詳細不明)が各1人でした。
- ・推定感染経路は、滝を含む河川でのレジャー活動を通じた水系感染が疑われる例が85%と大部分を占めています。



### 4 症状

- ・すべての患者で発熱症状が見られました。次いで筋肉数が77%と多く見られています。
- ・その他には倦怠感や肝機能障害が報告されています。



### 5 対策について

傷がある状態で川に入らない、川に入る際は怪我をしないような服や履き物を着用しましょう。  
また、川に入った後に発熱や目の充血、筋肉痛等が出た場合には、医療機関を受診し、川に入ったことを伝えてください。

### 6 参考資料

※レプトスピラ症は四類感染症です。  
診断した医師は直ちに最寄りの保健所へ届け出てください(全数報告です)。

国立感染症研究所 レプトスピラ症とは  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ra/leptospirosis.html>