

平成20年度病害虫発生予報第2号(5月予報)


<お知らせ> トマト黄化葉巻病の防除対策に関するお知らせがあります(本号8頁参照)。

今月のトピックス

<http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119>

黒かび病 (ピタヤ)

学名: *Rhizopus stolonifer*



本病は糸状菌による病害で、7月から10月にかけて発生が多い。はじめ水浸状でやがて小黑点(孢子のう)を伴った白色の菌糸をクモの巣状に生じ、発病から数日で軟化腐敗する。菌の生育適温は20~30 の高温性である。本病は生育中の果実には発生しないが、圃場内の残渣上などで増殖した菌が、空气中に分散して果実の果梗部や傷口から侵入し、輸送中及び市場で発生する。

予報の見方

- 1) 発生予察情報は、前月の調査に基づき発生程度が「並」以上の病害虫を中心に掲載しています。「やや少」以下の病害虫については通常掲載していません。
- 2) 「発生程度」は平年との比較を示しています。そのため、毎年その月で高い数値が続いた場合には、その月の「発生程度」は密度が高くても「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にしてください。

平成20年5月1日
沖縄県病害虫防除技術センター